




Baraque Cagnaux – Orchimont 63/7-8 & Pussemange – Sugny 66/3-4



Extrait de la carte topographique 63/7-8 & 66/3-4 de l'Institut Géographique National
Coordonnées Lambert belge, 1972, exprimées en mètres
Le tracé de l'aquifère alluvial est extrait des cartes géologiques Baraque Cagnaux - Orchimont (Dornal, 1899) et Pussemange - Sugny (Dornal, 1897)




Carte des informations complémentaires et des caractères des nappes




Echelle: 1/50 000

Carte des volumes d'eau prélevés



Echelle: 1/50 000



Coupes hydrogéologiques




Tableau de correspondance : Géologie - Hydrogéologie

ERE	SYSTEME	SERIE	ETAGE	ASSISE	ABREVIATION	LITHOLOGIE	UNITES HYDROGEOLOGIQUES
PALEOZOÏQUE	DEVONIEN	INFÉRIEUR	SIEGÉNIIEN	MOYEN	a1	Alluvions anciennes et modernes : argiles, limons, sables et graviers	Aquifère des alluvial
				INFÉRIEUR	S2	Représenté sur la carte par le faciès de Bouillon. Riche en éléments calcaires, est caractérisé par des calcaréophyllades, des bancs compacts quartzocalcaires et subsidiairement des bancs ou lentilles calcaires	Aquiclude à niveaux aquifères de Ville
			GEDINNIIEN	SAINT HUBERT	G2b	Représentée par le faciès d'Anlier qui est caractérisé par une alternance de phyllades et de schistes avec des quartzophyllades et avec des bancs ou des paquets de quartzites. Les quartzites sont très rarement et très légèrement calcaires et feldspathiques. Les roches gréseuses sont présentes sous forme de bancs isolés ou en paquets de 4 à 10 m et exceptionnellement de 15 à 25 m	Aquiclude à niveaux aquifères du Dévonien inférieur
				OIGNIES	G2a	Représentée par le faciès des phyllades de Laforêt qui se distingue par la nature phylladeuse des roches argileuses telles que les phyllades et les schistes phylladeux	Aquiclude du Dévonien inférieur
				MONDREPUITS	G1	Phyllades de Joigny, de consistance proche parfois des phyllades ardoisiers. L'assise, classée dans le faciès d'Anloy, est formée principalement de schistes et de phyllades bigarrés et diversément colorés	Aquiclude à niveaux aquifères du Dévonien inférieur
							La base, formée d'éléments grossiers : pouddingue, "arkose" et quartzite, surmontée par un ensemble schisteux composé de phyllades renfermant quelques strates calcaires, des quartzophyllades et des quartzites